

Yangıdyn Enj.

% 5 Fluniksin meglumin

Bileşimi:

Her ml de; 50 mg Fluniksin (Fluniksin meglumin) içeren enjeksiyonluk bir çözeltilidir.

Kullanım yeri:

Sığır ve atlarda anti-endotoksik, anti-piretik özelliklere sahip non-steroidal anti-enflamatuvar (NSAID), non-narkotik analjezik olarak kullanılır.

Sığır: Enfeksiyöz hastalıklara bağlı akut enflamasyonlarda, endotoksik şok, kolibasillozis, pneumonia ve kronik obstrüktif solunum sistemi hastalıklarıyla ilgili akut enflamasyonların tedavisinde; akut sığır pulmoner amfizemi (fog fever), akut mastitis tedavilerinde anti-enflamatuvar olarak kullanılır.

At: İskelet-kas sistemi ile ilişkili enflamasyon ve lokomotor bozukluklardan ileri gelen ağrılarda ve kolikten ileri gelen visseral ağrının azaltılmasında endikedir.

Kullanım şekli ve Dozu:

Sığır ve atlarda damar içi (IV) veya kas içi (IM) yolla uygulanır.

Sığır: 2 ml / 45 kg (2.2 mg/kg); Enflamasyonun durumuna göre gerekirse 24 saat aralıklarla 5 gün kullanılabilir. Yangıdyn uygulamasına ilaveten, akut yangıya neden olan etkenlere yönelik uygun bir sağaltım yapılmalıdır.

At: *Kas-iskelet sistemi bozukluklarında;* 1 ml / 45 kg (1.1 mg / kg) ; klinik cevaba göre gerekirse 24 saat aralıklarla 5 gün süreyle kullanılabilir. *Kolik'de;* 1 ml / 45 kg (1.1 mg / kg) ; kolik semptomları tekrarlar ise tedavi 1-2 kez tekrarlanabilir. Yangıdyn uygulamasına ilaveten kolik nedeni tayin edilmeli ve buna yönelik uygun sağaltım yapılmalıdır.

Gastrointestinal kanala kan akışının bozulduğu gastrik torsiyon veya diğer sebeplerle ilişkili endotoksemi veya septik şok olgularında önerilen doz ise; 1 ml / 200 kg (0.25 mg/kg) dır, uygulama 6-8 saat aralıklarla yapılır.

Ambalaj şekli:

20 ml